

VER FICHA TÉCNICA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

# Mosquicida BichoFora®

**CIPERMETRINA + CLORPIRIFOS**

Tratamiento curativo de gusaneras en todo tipo de heridas.



**PRESENTACIONES:**

Spray / tópicos 120 mL  
Spray / tópicos 240 mL  
Spray / tópicos 1000 mL / 1 Litro.



**ESPECIES DE DESTINO:**

Bovinos, equinos, porcinos, ovinos,  
caprinos y caninos.



**LIGERAMENTE PELIGROSO GRUPO III**



Lavarse las manos luego de aplicado. No perforar. No pulverizar sobre llama, no arrojar al fuego. Mantener este producto en un lugar fresco y seco (15-30 °C), protegido de la luz solar. Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

[www.snatsagt.com](http://www.snatsagt.com)



#### FÓRMULA:

Cada 100 mL. Contienen:

Cipermetrina..... 12 g  
Clorpirifos..... 5 g  
Azul de metileno..... 1 g  
Excipientes c.s.p..... 100 mL

#### INDICACIONES:

Tratamiento preventivo y curativo de gusaneras en todo tipo de heridas. Puede utilizarse en animales de cualquier edad, inclusive recién nacidos. Erradica gusaneras en trabajos de rutina como cirugías, ombligo, descorné y descolade gracias a su poder repelente. En el caso de gusaneras profundas, es necesario asegurar la penetración del producto en las cavidades. También infestaciones localizadas de sarna y lesiones podales.

#### VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Es exclusivamente la tópica.

#### DOSIFICACIÓN:

Agitar varias veces el envase antes de aplicar. Rociar uniformemente la herida desde una distancia de 10 a 15 cm. asegurando la penetración del producto dentro de la herida. Aplicar también alrededor de la misma, formando un halo de 5 cm.

En caso de bicheras profundas, es necesario asegurarse la penetración del producto en las cavidades.

En el caso de las gusaneras, la aplicación se puede repetir una vez por día hasta la curación. El número de aplicaciones como preventivo depende del tipo de herida y las condiciones ambientales, pero se recomienda en el caso de gusanera de ombligo una sola aplicación dentro de las 24 horas del nacimiento. En caso de las heridas de castración se recomiendan 2 aplicaciones separadas por 72 horas.

#### LIGERAMENTE PELIGROSO GRUPO III

Elaborado en Guatemala por TECNIAGRO  
INDUSTRIAL DE GUATEMALA, S.A.  
PARA SNATSA.

 [www.snatsagt.com](http://www.snatsagt.com)

# FICHA TÉCNICA

CURABICHERAS, CICATRIZANTE,  
LARVICIDA Y REPELENTE

#### USO VETERINARIO

#### CONTRAINDICACIONES Y RESTRICCIONES:

No usar en casos de hipersensibilidad al principio activo a a alguno de los excipientes.

#### PERIODO DE RETIRO:

No administrar el producto 48 horas antes del sacrificio de animales, ni utilizar la leche para consumo humano hasta 24 horas después del tratamiento.

#### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

No se debe usar en felinos. Son tóxicas para peces, pájaros y abejas. Los signos de intoxicación por piretroides pueden ser salivación, depresión, vómitos, diarrea, temblores musculares, convulsión, incluso muerte.

No inhalar. No se deben inhalar, comer, beber ni fumar durante su aplicación.

Aplicar a favor del viento.

Evitar el contacto directo con la piel y mucosas. Lavarse las manos luego de aplicado.

No perforar. No pulverizar sobre llama. No arrojar al fuego. Mantener este producto en un lugar fresco y seco (15-30 °C), protegido de la luz solar. Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

No utilizar este producto en animales con peso bajo, enfermos o con problemas hepáticos.

Aquellos animales sensibles al producto podrían presentar balanceo de cabeza a cola, respiración agitada, disminución del apetito, sin embargo, estos síntomas tienden a desaparecer después de 24 horas de la aplicación del producto.

#### ANTIDOTO:

Solución de Sulfato de Atropina al 1%.

